

## 20 juin 2007:

# Ce patient a-t-il un érythème migrant ?

**Objectifs de formation :** Revoir la prise en charge de l'érythème migrans ou migrateur

**Date de publication :** 20/06/2007

**Date d'expiration :** 20/07/2009

Jama; 297/23/2617

### Questions :

#### 1. L'érythème migrant ou migrateur

- A. Est le plus souvent observé en tant que manifestation d'une infection avec rash associé à une tique du sud (STARI).
- B. Marque le diagnostic de maladie de Lyme.
- C. Est un effet indésirable de l'administration d'antibiotique pour une suspicion de morsure de tique.
- D. Est une indication d'antibiothérapie.

#### 2. Dans la maladie de Lyme, à la suite d'une morsure d'une tique infectée, la spirochète *Borrelia burgdorferi* peut être transmise dans la peau de l'hôte. La *Borrelia* migrant de l'intestin moyen de la tique vers les glandes salivaires à la suite de la morsure,

- A. L'attachement d'une tique pendant moins de 24 heures résulte rarement en une infection.
- B. La tique ne doit pas être retirée jusqu'à administration d'un traitement antibiotique.
- C. L'érythème migrant ou migrateur peut survenir dans des sites multiples des membres ou du tronc.
- D. L'érythème migrant ou migrateur a souvent disparu au moment où la peau entourant la morsure a été infectée

#### 3. Les patients ayant un érythème migrant qui rapportent des morsures de tiques

- A. Doivent être interrogés sur le délai qui s'est écoulé entre la morsure et le début du rash.
- B. Développent typiquement un rash progressivement en quelques jours à quelques semaines.
- C. Peuvent avoir des symptômes systémiques tels qu'une fièvre à bas bruit, des frissons, des cervicalgies, des arthralgies, des myalgies ou des céphalées.
- D. Toutes les réponses.

#### 4. A la fois chez les patients américains et européens, le tableau clinique le plus fréquent de l'érythème migrant ou migrateur est

- A. Des plaques multiples groupées.
- B. Des macules ponctuées multiples.
- C. Une lésion solitaire.
- D. Une lésion ou plus avec une zone plus claire.

#### 5. Si un érythème migrant ou migrateur est soupçonné, lequel des tests suivants est sensible pour diagnostiquer à la fois la maladie de Lyme et une STARI?

- A. Culture de la lésion.
- B. Une réaction en chaîne à la polymérase.
- C. La sérologie.
- D. Aucune des réponses.